

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam beachten?
3. Wie ist Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam aufzubewahren?

# Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam

Creme

Wirkstoff: Dexpanthenol

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist: Dexpanthenol

1 g Creme enthält 0,05 g Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Kaliumsorbitat (Ph.Eur.), Wollwachs, Wollwachsalkohole, Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), Weißes Vaseline, (Isooctadecanol)(diglycerol)succinat, Glyceroltrialkanoat (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>), Natriumcitrat-Dihydrat, Citronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser.

Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam ist in Packungen mit 35 g Creme und 100 g Creme erhältlich.

## **1. WAS IST Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam ist ein Arzneimittel zur Unterstützung der Wundheilung.

von:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Telefon: (07 31) 4 02 02, Telefax: (07 31) 4 02 73 30

www.ratiopharm.de

hergestellt von:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren

Telefon: (0 73 44) 1 40, Telefax: (0 73 44) 14 16 20

www.merckle.de

Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam wird angewendet zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen, leichten Hautschädigungen.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam BEACHTEN?**

Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Dexpanthenol oder einem der sonstigen Bestandteile von Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam sind
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Kaliumsorbitat sind

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam ist erforderlich Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit besteht für Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam keine Anwendungsbeschränkung.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam  
Wollwachs, Cetylstearylalkohol und Kaliumsorbat können örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam im Genital- oder Analbereich und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

### **3. WIE IST Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, wird Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam ein- bis mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen.

#### Dauer der Behandlung

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam zu stark oder zu schwach ist.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b> mehr als 1 von 10 Behandelten	<b>Häufig:</b> weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b> weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten	<b>Selten:</b> weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b> weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

#### Nebenwirkungen

Selten: Unverträglichkeitsreaktionen (wie z. B. allergische Hautreaktionen)

Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten.

Aufgrund des Gehaltes an Kaliumsorbat können bei entsprechend veranlagten Patienten Reizerscheinungen, wie Hautentzündungen, auftreten.

#### Gegenmaßnahmen

Wenn die aufgeführten Nebenwirkungen zum ersten Mal auftreten oder Ihre Beschwerden sich verschlimmern sollten, wenden Sie Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam nicht weiter an und suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

*Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.*

### **5. WIE IST Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Anbruch ist Panthenol-ratiopharm® Wundbalsam noch 12 Monate haltbar.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

#### **Stand der Information:**

März 2003

Versionscode: Z04