

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

MUCOKEHL® D5 SINE Augentropfen Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff:

Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 aquos.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender:

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie **MUCOKEHL® D5 SINE** nicht anwenden?

Nicht anwenden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (*Mucor racemosus*)
- Autoimmunerkrankungen
- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangerschaft und Stillzeit

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Art und Dauer der Anwendung:

Zum Einträufeln in den Bindehautsack.

Anwendungshinweis:

1. Waschen Sie ihre Hände.
2. Öffnen Sie den Folienbeutel und entnehmen Sie den Streifen zusammenhängender Einzeldosisbehältnisse.
3. Trennen Sie ein Einzeldosisbehältnis vom Streifen ab (siehe Abb.1).
4. Geben Sie die verbliebenen Einzeldosisbehältnisse wieder zurück in den Folienbeutel und verschließen Sie diesen durch Umknicken der überstehenden Folie. Bewahren Sie den Folienbeutel weiterhin in der Faltschachtel auf.
5. Öffnen Sie das Einzeldosisbehältnis durch zügiges Abdrehen der Verschlusskappe. Achten Sie darauf, dass Sie die Spitze des Einzeldosisbehältnisses nicht berühren (siehe Abb. 2).
6. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und ziehen Sie mit dem Zeigefinger das Unterlid leicht nach unten. Nehmen Sie mit der anderen Hand das Einzeldosisbehältnis zwischen Daumen und Zeigefinger und halten Sie es senkrecht über das Auge. Achten Sie dabei darauf, dass die Spitze des Einzeldosisbehältnisses in keinem Fall ihr Auge berührt. Drücken Sie mit den Fingern leicht auf das Einzeldosisbehältnis, um einen Tropfen in den heruntergezogenen Bindehautsack fallen zu lassen (siehe Abb. 3).
7. Schließen Sie ihre Augen und drücken Sie mit der Fingerspitze 1-2 Minuten lang gegen den inneren Augenwinkel. Dadurch verhindern Sie, dass der Tropfen durch den Tränenang in den Rachen abfließt. Somit verbleibt der größte Teil des Tropfens im Auge. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 gegebenenfalls für das andere Auge.
8. Entsorgen Sie das Einzeldosisbehältnis nach der Anwendung



Abb. 1




Abb.2



Abb.3

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahmen zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie **MUCOKEHL® D5 SINE** anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Aufgrund des Gehaltes von **MUCOKEHL® D5 SINE** an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil *Mucor racemosus* ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Einzeldosisbehältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

MUCOKEHL® D5 SINE enthält kein Konservierungsmittel. Geöffnete Einzeldosisbehältnisse dürfen deshalb nicht aufbewahrt werden. Die nach der Anwendung im Einzeldosisbehältnis verbleibende Restmenge ist zu verwerfen.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung.

Zusammensetzung:

1 Einzeldosisbehältnis à 0,5 ml Augentropfen enthält:

Wirkstoff:

0,5 ml Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 aquos. (HAB, Vorschrift 5b, Lsg. D1 mit Wasser für Injektionszwecke).

Sonstige Bestandteile:

1-molare NaOH-Lösung (zur pH-Wert-Einstellung)

Darreichungsform und Inhalt:

10 Einzeldosisbehältnisse à 0,5 ml Augentropfen zur Anwendung am Auge /

10 Einzeldosisbehältnisse à 0,5 ml Augentropfen zur Anwendung am Auge (unverkäufliches Muster).

Ein Streifen mit 5 Einzeldosisbehältnissen mit je 0,5 ml Augentropfen ist in einem Folienbeutel eingeschweißt.

Eine Packung **MUCOKEHL® D5 SINE** Augentropfen enthält zwei Folienbeutel.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG

Postfach 1355

D-27316 Hoya

Telefon: +49 (0) 4251 93 52-0

Telefax: +49 (0) 4251 93 52-291

E-Mail: info@sanum.com

Nicht über 25 °C lagern!

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 94225.00.00

Apothekenpflichtig

Stand der Gebrauchsinformation: 06/2023