

LIVSANE Macrogol 4000

PZN: 19288400

Kategorie:	Medizinprodukte
Darreichungsform:	Pulverbeutel
Menge:	40 Beutel à 10 g
Produkteigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • trägt zur Verbesserung der Darmpassage bei, ohne die Darmschleimhaut zu reizen • ohne Aroma- und Hilfsstoffe
Zusammensetzung:	10 g Macrogol 4000
Anwendung:	<p>Macrogol 4000 ist sicher in der Anwendung und ermöglicht daher eine große Flexibilität bei der Dosierung.</p> <p>Ohne ärztlichen Rat sollte dieses Arzneimittel wie folgt eingenommen werden: Erwachsene: 1 Beutel 1 bis 3 Mal täglich, je nach individuellem Ansprechen. Für schnellere Ergebnisse können 2 Beutel (20 g Macrogol 4000) als Anfangsdosis eingenommen werden. Bei längerer Anwendung kann die Dosis auf 1 Beutel 1-2 Mal täglich reduziert werden.</p> <p>Die Einnahme kann von Tag zu Tag variieren: Zum Beispiel an einem Tag 1 Beutel, vorzugsweise abends vor dem Schlafengehen, und am nächsten Tag 1 Beutel zwischen Frühstück und Mittagessen und einen weiteren Beutel abends vor dem Schlafengehen. Kinder über 8 Jahre: 1 Beutel 1 bis 2 Mal täglich..</p>
Warnhinweise:	<p>Hinweis: Sprich mit Deinem Arzt oder Apotheker, bevor Du Macrogol einnimmst. Wende Macrogol nicht an, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du allergisch auf Macrogol reagierst. • Du von einer schweren Darmentzündung (z. B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) betroffen bist. • Du ein toxisches Megakolon hast. • Du an einem Darmverschluss oder Bauchschmerzen unbekannter Ursache leidest. • Dein Darm perforiert ist oder das Risiko einer Perforation besteht. <p>Während Schwangerschaft und Stillzeit solltest Du Macrogol 4000 nur nach ärztlicher Rücksprache anwenden. Vorsicht bei Neigung zu Elektrolytstörungen oder eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion.</p>
Verantwortliches Unternehmen:	<p>Fiterman Pharma S.R.L, Str. Moara de Foc Nr. 35, 700520, Iași, Rumänien.</p> <p>Vertrieb EU: PXG Pharma GmbH, Pfingstweidstrasse, 10-12, 68199 Mannheim, Deutschland.</p>